Par Rapport au Memoire
sur l'Ecartement des Os du Bassin.

Pour rediger
après les affaires de la Symphise.

L'ecartement des Os du Bassin, dit l'Auteur, etoit longtems un fait de Contestation, jusqu'à ce que Mr. Louis ait demontré, qu'il se peut effectuer soit par un Vice rachitique dans les enfans, soit par un effort violent, ou par l'etat de grossesse, ou par un enfantement laborieux. Selon l'Auteur un tel ecartement peut aussi être produit par une Matiere goutteuse-rheumatique etc. portée sur ces parties. Il prouve ces propositions par quelques observations sur quelques ecartemens de cette espece, dont l'un a été pris et traité pour une luxation du femur.
Apres cet recit detaillé l'Auteur entre dans la Specification des Causes de cet ecartement, et a ce rapport il en distingue trois especes, ce qui est occasioné par une Cause interne —

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

ARC 28 d 12 n°66

ou externe, ou par l'une et l'autre en même tems. Il etablit après cela les signes et les differentes especes de l'ecartement, qui peut se faire en haut, en bas ou en arrière. Des signes il y en a, qui lui sont propres et d'autres qu' il a communs avec la luxation de la cuisse.

Souvent les signes externes seuls ne decelent pas la maladie, alors il faut se tenir au signes commemoratifs. L'auteur a observé, que dans la diduction des os du bassin par une cause interne les os innominés sont toujours plus bas, qu'a l'ordinaire, ce qui rend le malade couché et bien etendu plus grand, que quand il est debout, non comptant ce, que l'elasticité des vertebres intervertebrales y contribue dans le premier cas. Le même doit arriver aussi quelques fois dans les femmes grosses, quand les symphyses du bassin se gonflent, et s'ecartent, comme l'auteur a observé.

En outre l'auteur ne croit gueres, qu'un pareil ecartement des os du bassin se peut faire sans une Cause interne predisposante.

Quant au Prognostique de cette Maladie, il est moins a craindre de l'ecartement qui est produit par une Cause interne, que de celui qui est innato.
La Cure indiquée de l'auteur consiste a obvier aux premiers Symptomes, par les saignées, les anodyns et les resolutifs convenables. A cet egard conviennent quelques fois les bains chauds. après il s'agit de rapprocher et de contenir les parties, faire usage des repercussifs, des bains froids et des medicamens nervins, ce qui demande beaucoup de Circonspection de la part du Chirurgien.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE